

Terveydenhuollon laitoshoidon hoitoilmoitustilastot

PL 220, 00531 Helsinki
 Puh. (09) 3967 2346 Mikko Nenonen
 Puh. (09) 3967 2204 Jouni Rasilainen
 Fax. (09) 3967 2459
 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Reumasairauksien laitoshoidon hoito Suomessa vuonna 2000 sekä katsaus kehitykseen vuosina 1987 - 2000

Aikuisreuman hoito siirtyy avohoitoon, lapsireumaattikkoja yhä enemmän laitoshoidon piiriin, toimenpiteiden määrä näyttää vakiintuneen.

Vuonna 2000 Suomessa hoidettiin terveydenhuollon laitoksissa yhteensä 7 283 aikuisnivelpotilasta. Heidän hoitoonsa käytettiin 11 866 hoitajaksoa ja 104 368 hoitopäivää. Laitoshoidon palveluja käyttävä potilas kävi laitoshoidossa vuonna 2000 keskimäärin 1,6 kertaa (Taulukko 1). Vuodesta 1987 laitoshoidossa olevien aikuisreumapotilaiden määrä on vähentynyt lähes 3 700 potilasta (33%). Myös hoitajaksojen määrä on vähentynyt kolmanneksella. Hoitopäivien määrä sen sijaan on vähentynyt yli 70%.

Vuonna 2000 laitoksissa hoidettujen lasten reumaa sairastavien potilaiden lukumäärä oli 805. Tämä oli 2,2-kertainen vuoden 1987 potilaiden määrään verrattuna. Hoitajaksojen määrä kasvoi tuona aikana yli 3,7-kertaiseksi, mutta hoitopäivien määrässä ei juuri ollut muutoksia. Samalla myös hoitajaksojen määrä potilasta kohti kasvoi 1,9:stä 3,1:een.

Taulukko 1.

Yhteenveto aikuisten nivelreuman ja lasten reuman hoitoon käytetyistä vuodeosastopalveluista sekä hoidon intensiteetistä Suomessa vuosina 1987, 1992, 1996, 1997 ja 2000.

	1987	1992	1996	1997	2000
Aikuisten nivelreuma					
Potilaita	10952	10592	8839	8811	7283
Hoitajaksoja	18167	19265	13929	13870	11866
Hoitopäivät	371218	332044	175138	165108	104368
Hoitotunnit/potilas	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6
Lasten reuma					
Potilaita	363	416	667	720	805
Hoitajaksoja	673	1012	2022	2190	2508
Hoitopäivät	6835	6870	7038	7142	6920
Hoitotunnit/potilas	1.9	2.4	3.0	3.0	3.1

Nivelreumapotilaille tehtyjen lonkan tekonivelleikkausten vuotuinen määrä vähentyi voimakkaasti vuosien 1987 – 1997 aikana (Taulukko 2). Vuonna 2000 näitä leikkauksia tehtiin nivelreumapotilaille 250, joten vuotuinen toimenpidemäärä näyttää vakiintuneen. Samaan aikaan nivelrikkopotilaille tehtävien lonkan tekonivelleikkausten määrä on jatkanut tasaista kasvua, joten kyseessä ei ole yleinen toimenpidemäärien väheneminen. Ranteen luudutusleikkausten määrä reumapotilailla on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2000 näitä toimenpiteitä tehtiin 322 hoitojaksolla, joka on kaksinkertainen määrä vuoteen 1987 verrattuna.

Taulukko 2.

Yhteenveto eräistä nivelreuma- ja nivelrikkopotilaille suoritetuista leikkauksista Suomessa vuosina 1987, 1992, 1996, 1997 ja 2000.

	1987	1992	1996	1997	2000
Nivelreuma:					
Lonkan kokotekoniveliä	355	345	297	232	250
Ranteen luudutusleikkauksia	160	307	319	305	322
Nivelrikko:					
Lonkan kokotekoniveliä	2350	3055	3737	3922	4245