

Raskaudenkeskeytykset 2008 - ennakkotiedot

20.3.2009

Aborter 2008 - preliminära uppgifter

Induced abortions 2008 - preliminary data

Anna Heino
+358 20 610 7177

Anne Soimula
+358 20 610 7359

Mika Gissler
+358 02 610 7279

sähköposti:
etunimi.sukunimi@thl.fi

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2008 tehtiin 10 230 raskaudenkeskeytystä eli 8,8 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohden. Tämä on noin 310 keskeytystä (-3,0 %) vähemmän kuin vuonna 2007. Raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut viime vuosina melko tasaisesti. Vuonna 2004 keskeytyksiä tehtiin vielä 11 165. Vähenneminen johtuu pääasiallisesti alle 20-vuotiaiden keskeytysten selkeästä vähenemisestä.

Keskeytysten lukumäärä väheni vuonna 2008 kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi yli 40-vuotiaiden ikäryhmissä. 35–39-vuotiaiden ikäryhmässä keskeytykset vähennivät 7,5 prosenttia. Alle 20-vuotiaiden keskeytykset jatkoivat myös vähennemistään (-5,6 %). Keskeytysten määrä kasvoi eniten yli 45-vuotiailla. Eniten keskeytyksiä tehdään kuitenkin edelleen 20–24-vuotiaille (17,7 tuhatta vastaavanikäistä naista kohden). Sairaankoitoiriittäin tarkasteltuna eniten keskeytyksiä tehtiin Ahvenanmaalla (11,4/1000) ja Lapin sairaankoitorissa (11,0/1000) ja vähiten Etelä-Savon (5,2/1000) ja Etelä-Pohjanmaan sairaankoitorissa (6,1/1000).

Tervyden ja hyvinvoinnin laitos
(THL)


Institutet för hälsa och välfärd
(THL)

National Institute for Health and
Welfare (THL)

Puhelin 020 610 6000
Telefon +358 20 610 6000
Phone +358 20 610 6000

www.thl.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)



* Vuoden 2008 tiedot ovat ennakkotietoja ja perustuvat tilanteeseen 2.3.2009.

Noin 63 prosenttia raskaudenkeskeytyspotilaista ilmoitti käyttäneensä jonkinlaista ehkäisymenetelmää raskauden alkaessa. Alle 20-vuotiaista 40,7 prosenttia ei ollut käyttänyt mitään ehkäisyä tai ehkäisymenetelmää ei ollut tietoa. 44,0 prosenttia alle 20-vuotiaista keskeytyspotilaista ilmoitti käyttäneensä ehkäisynä kondomia ja jälkiehkäisyä oli käyttänyt 2,2 prosenttia. Kaikista keskeytyspotilaista jälkiehkäisyä oli käyttänyt 3,0 prosenttia eli hieman vähemmän kuin vuonna 2007.

Yleisin suunniteltu ehkäisymenetelmä keskeytyksen jälkeen oli e-pilleri (53,8 %). E-pilleriä suunniteltiin ehkäisykeinoksi 77,8 prosentille alle 20-vuotiasta. Suunniteltua ehkäisyä ei ollut tai siitä ei ollut tietoa 10 prosentilla keskeytyspotilaista. Alle 20-vuotiaista 5,9 prosentilla ei ollut suunniteltua ehkäisyä tai siitä ei ollut tietoa.

92,9 prosenttia raskaudenkeskeyksistä tehtiin ennen 12. raskausviikkoa. Ennen 7. raskausviikkoa tehtyjen keskeytysten osuus on pysytellyt viime vuosina melko vakaana, ollen 59,8 prosenttia vuonna 2008. Vuonna 2008 vajaalla puolella keskeytyspotilaista oli vähintään yksi aikaisempi synnytys. Vähintään yksi aiempi keskeytys oli 35,2 prosentilla keskeyttäneistä ja vähintään kaksi aiempaa keskeytystä 11,6 prosentilla. Keskeytyspotilaista 20,8 prosenttia oli naimisissa ja naimattomia oli 75,6 prosenttia. Eronneita ja leskiä oli 8,4 prosenttia. Potilaista 52,3 prosenttia ei ollut koskaan synnyttänyt ja 64,8 prosentilla ei ollut aikaisempia raskaudenkeskeyksiä.

Sosiaaliset syyt keskeytyksen perustena lisääntyivät edelleen (91,0 %) vuonna 2008. Muita yleisiä syitä olivat alle 17 vuoden ikä (4,9 %), yli 40 vuoden ikä (3,7 %) ja neljän lapsen synnyttäminen (1,9 %). 0,4 % keskeyksistä tehtiin lääketieteellisellä perusteella eli sairaudesta, ruumiinväistä tai heikoudesta naisen hengelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi. Mahdollisen tai todetun sikiövaurion vuoksi tehtiin hieman vähemmän keskeytyksiä kuin vuonna 2007 (2,8 % kaikista keskeyksistä). Keskeytyksen perustena on vuodesta 2001 alkaen voinut käyttää useampaa kuin yhtä syytä. Vuonna 2008 useampaa kuin yhtä syytä oli käytetty 5,0 prosentissa keskeyksistä, useimmiten sosiaalinen peruste yhdistettynä ikäperusteeseen.

Raskaudenkeskeyksen menetelmistä eniten käytettiin lääkkeellistä keskeytystä, 69,4 prosentissa kaikista keskeyksistä. Lääkkeellisen raskaudenkeskeyksen käyttö aloitettiin vuonna 2000, jonka jälkeen se nopeasti yleistyi. Lääkkeellisen keskeytyksen salliminen ei näytä lisänneen raskaudenkeskeytysten kokonaismäärää. Ennen lääkkeellisen keskeytyksen mahdollisuutta suosituin keskeytämismenetelmä oli laajennus ja imukaavinta. Sen käytön osuus oli vuonna 2000 vielä 84,4 prosenttia kaikista keskeyksistä, mutta oli vuonna 2008 enää 20,9 prosenttia.

Käsitteet ja määritelmät:

Raskauden keskeytys: Ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei täytä synnytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä.

Taustatietoja:

Vuoden 2008 tiedot ovat ennakkotietoja ja perustuvat tilanteeseen 2.3.2009. Lopulliset, tarkastetut tiedot julkaistaan syksyllä 2009. Sterilointitiedot julkaistaan kesäkuussa 2009.

SVT-sarjan (Suomen virallinen tilasto) laatuseloste:

(<http://www.stakes.fi/FI/tilastot/tausta/Laatuselosteet/raskaudenkeskeytysjasterilisaatio.htm>)

Taulukot:

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969–1970, 1975–2008*

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2008*

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970–2008*

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2008*

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985–2008*

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987–2008*

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987–2008*

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989–2008*, %

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983–2008*, %

Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000–2008*

*) Ennakkotieto

Raskaudenkeskeytykset 2008 - ennakkotiedot

20.3.2009

Aborter 2008 – preliminära uppgifter

Induced abortions 2008 – preliminary data

Anna Heino
+358 20 610 7177


Anne Soimula
+358 20 610 7359

Mika Gissler
+358 02 610 7279

e-post:
fornamn.efternamn@thl.fi

År 2008 gjordes enligt preliminära uppgifter 10 230 aborter, dvs. 8,7 aborter per 1 000 fertila kvinnor (15–49 år). Detta är cirka 310 aborter (-3,0 %) färre än 2007. Antalet aborter har minskat ganska jämnt under de senaste åren. År 2004 utfördes ännu 11 165 aborter. Minskningen beror i huvudsak på att antalet aborter i åldrarna under 20 år minskat tydligt.

År 2008 minskade aborterna i alla andra åldrar utom i åldrarna över 40 år. Aborterna bland kvinnor i åldrarna 35–39 år minskade med 7,5 procent. Aborterna bland kvinnor under 20 år fortsatte också att minska (-5,6 procent). Antalet aborter ökade mest i åldrarna över 45 år. Mest aborter utfördes dock fortfarande på kvinnor i åldrarna 20–24 år (17,7 per 1 000 kvinnor i samma ålder). En granskning enligt sjukvårdsdistrikt visar att mest aborter utfördes på Åland (11,4/1 000) och i Lapplands sjukvårdsdistrikt (11,0/1 000), och minst i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt (5,2/1 000) och i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt (6,1/1 000).



* Uppgifterna för 2008 är preliminära och grundar sig på situationen 2.3.2009.

Cirka 63 procent av abortpatienterna uppgav att de använt någon typ av preventivmedel när graviditeten uppstod. I åldrarna under 20 år var 40,7 procent av fallen sådana där inget preventivmedel används eller där det inte fanns några uppgifter om preventivmetoden. Av abortpatienterna under 20 år uppgav 44,0 procent att de använt kondom som preventivmedel. Totalt 2,2 procent hade använt akut p-piller. Av alla abortpatienter hade 3,0 procent använt akut p-piller, dvs. lite färre än 2007.

Den vanligaste planerade preventivmetoden efter ett abortingrepp var p-piller (53,8 procent). P-piller planerades som preventivmedel för 77,8 procent av kvinnorna under 20 år. Totalt 10 procent av abortpatienterna hade registrerats som fall utan planerad preventivmetod, eller där det inte fanns några uppgifter om planerad preventivmetod. I åldrarna under 20 år var motsvarande procenttal 5,9 procent.

Totalt 92,9 procent av aborterna gjordes före den 12:e gravidetsveckan. Andelen aborter som utförts före den 7:e gravidetsveckan har varit rätt oförändrad de senaste åren. År 2008 var den 59,8 procent. År 2008 hade knappt hälften av abortpatienterna fött minst ett barn. Totalt 35,2 procent av dem som genomgick abort hade genomgått minst en tidigare abort och 11,6 procent hade genomgått minst två tidigare aborter. Av abortpatienterna var 20,8 procent gifta och 75,6 procent ogifta. Andelen frånskilda och änglar var 8,4 procent. Av patienterna hade 52,3 procent aldrig fött barn och 64,8 procent hade inte genomgått abort tidigare.

Antalet aborter på sociala indikationer ökade fortfarande (91,0 procent) 2008. Andra vanliga indikationer var ålder under 17 år (4,9 procent) eller över 40 år (3,7 procent) och fyra tidigare förlossningar (1,9 procent). Av aborterna utfördes 0,4 procent på medicinsk indikation, dvs. till följd av sjukdom, kroppslyte eller svaghet som kan medföra fara för kvinnans liv eller hälsa. År 2008 utfördes lite färre aborter på grund av möjlig eller konstaterad fosterskada än 2007 (2,8 procent av alla aborter). Från och med 2001 har flera än en abortindikation kunnat åberopas. År 2008 hade fler än en indikation åberopats vid 5,0 procent av aborterna, vanligen social indikation i kombination med åldersindikation.

I fråga om abortmetoder användes farmakologisk abort mest, nämligen vid 69,4 procent av alla aborter. Farmakologisk abort infördes år 2000, varefter den blivit snabbt allmänna. Att tillåta farmakologisk abort verkar inte ha ökat det totala antalet aborter. Innan möjligheten till farmakologisk abort fanns, var den populäraste abortmetoden utvidgning och vakuumaspiration. År 2000 användes den metoden ännu vid 84,4 procent av alla aborter, men endast vid 20,9 procent av aborterna år 2008.

Begrepp och definitioner:

Abort (avbrytande av graviditet): En graviditet som avbrutits artificiellt och som inte överensstämmer med definitionen på en förlossning och där man vet att fostret inte dött intrauterint före ingreppet.

Bakgrundsinformation:

Uppgifterna för 2008 är preliminära och grundar sig på situationen den 2 mars 2009. De slutgiltiga, granskade uppgifterna offentliggörs under hösten 2009. Steriliseringssuppgifter publiceras i juni 2009.

FOS-kvalitetsbeskrivning (Finlands officiella statistik) för statistiken över aborter:
(http://www.stakes.fi/SV/tilastot/kvalitet/aborter_steriliseringar.htm)

Tabeller:

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969–1970, 1975–2008*

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2008*

Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2008*

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2008*

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2008*

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2008*

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2008*

Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter före abort 1980, 1985, 1989–2008*, %

Tabell 9: Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2008*, %

Tabell 10: Abortmetoder 2000–2008*

*) Preliminära uppgifter



Raskaudenkeskeytykset 2008 - ennakkotiedot

20.3.2009

Aborter 2008 – preliminära uppgifter

Induced abortions 2008 – preliminary data

Anna Heino
+358 20 610 7177

Anne Soimula
+358 20 610 7359

Mika Gissler
+358 02 610 7279

e-mail:
firstname.lastname@thl.fi

According to preliminary data, 10 230 induced abortions were performed in Finland in 2008, which is 8.7 abortions per thousand women of childbearing age (15–49 years). This was some 310 abortions (-3.0%) less than in 2007. The decrease in the number of induced abortions has been quite steady during the last few years. In 2004, the number of induced abortions still totalled 11 165. The decreasing trend is largely explained by a distinct decline in the number of abortions among under-20s.

The number of induced abortions decreased in 2008 in all age groups except in the over-40 age groups. In the 35–39 age group, the number of abortions fell by 7.5 per cent. The decreasing trend continued among the under-20s (-5.6%). The greatest increase was observed in the over-45 age group. However, the 20–24 age group continued to have the highest number of abortions (17.7 per thousand women of the same age). An analysis by hospital district shows that the rate of abortion was highest in the hospital districts of Åland (11.4% per 1000) and Lapland (11.0% per 1000), and lowest in the hospital districts of Etelä-Savo (5.2% per 1000) and South Ostrobothnia (6.1% per 1000).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(THL)


Institutet för hälsa och välfärd
(THL)

National Institute for Health and
Welfare (THL)

Puhelin 020 610 6000
Telefon +358 20 610 6000
Phone +358 20 610 6000

www.thl.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)



* The data for 2008 are preliminary and based on the situation on 2 March 2009.

Some 63 per cent of abortion patients reported having used some contraceptive method at the start of the pregnancy. In the under-20 age group, 40.7 per cent of abortion patients had used no contraceptive method or no data were available. In the same age group, 44.0 per cent reported having used a condom and 2.2 per cent post-coital oral contraceptive. Of all abortion patients, 3.0 per cent had used post-coital oral contraceptive, which is slightly less than in 2007.

The most common planned contraceptive method after abortion was the pill (53.8%). For abortion patients under the age of 20, the pill was the planned contraceptive method in 77.8 per cent of cases. Approximately 10 per cent of abortion patients had no planned contraceptive method or there was no knowledge of the method. In the under-20 age group, 5.9 per cent had no planned contraceptive method or there was no knowledge of the method.

Most abortions (92.9%) were performed before the 12th week of gestation. The proportion of induced abortions performed before the 7th week of gestation has been relatively stable in recent years, being 59.8 per cent in 2008. In 2008, less than half of abortion patients had at least one previous delivery. At least one previous induced abortion had been performed on 35.2 per cent and at least two previous abortions on 11.6 per cent of abortion patients. The proportion of married abortion patients was 20.8 per cent, compared with 75.6 per cent for unmarried patients. Of all abortion patients, 8.4 per cent were divorced or widows. The proportion of abortion patients who had never given birth was 52.3 per cent, while 64.8 per cent did not have previous abortions.

The proportion of abortions performed on social grounds continued to increase in 2008 (being 91.0%). The other common reasons for abortion were the patient being under 17 (4.9%), over 40 (3.7%), or having given birth to four children (1.9%). Of the abortions, 0.4 per cent were performed on medical grounds, that is, the pregnancy would have endangered the woman's life or health because of illness, structural anomaly or debility. The number of abortions performed because of a potential or detected foetal defect was slightly lower than in 2007 (2.8% of all induced abortions). Since 2001, abortion has been possible on several grounds. In 2008, 5.0 per cent of induced abortions were performed on more than one ground; in most cases, on a combination of social and age-related grounds.

Abortions induced by drugs were the most common abortion method, accounting for 69.4 per cent of all induced abortions. Abortions induced by drugs have quickly become more common since they were first started in 2000. However, the introduction of medical abortion has not increased the total number of induced abortions. Before medical abortion was introduced, the most common method of abortion was dilatation and suction curettage. While dilatation and curettage still accounted for 84.4 per cent of all abortions in 2000, eight years later in 2008, its share had dropped to 20.9 per cent.

Concepts and definitions:

Induced abortion: an artificially induced termination of pregnancy which does not comply with the definition of a birth and in which there is no indication of intrauterine foetal death prior to the termination.

Additional information:

The data for 2008 are preliminary and based on the situation on 2 March 2009. The final, revised data will be published in autumn 2009. The data on sterilisations will be published in June 2009.

Quality report of the OSF publication series (Official Statistics of Finland):
<http://www.stakes.fi/FI/tilastot/tausta/Laatuselosteet/raskaudenkeskeytysjasterilisaatio.htm>.

Tables:

Table 1: Induced abortions by age group, 1969–1970, 1975–2008*

Table 2: Induced abortions by hospital district and age group, 2008*

Table 3: Indications for induced abortions, 1970–2008*

Table 4: Induced abortions by indication, 2008*

Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985–2008*

Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987–2008*

Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987–2008*

Table 8: Contraceptives used by abortion patients, 1980, 1985, 1989–2008*, %

Table 9: Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983–2008*, %

Table 10: Methods for induced abortions, 2000–2008*

*) Preliminary data

- Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969–1970, 1975–2008*
- Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2008*
- Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970–2008*, %
- Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2008*
- Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985–2008*
- Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987–2008*
- Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987–2008*
- Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy ennen keskeytystä 1980, 1985, 1989–2008*, %
- Taulukko 9: Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983–2008*, %
- Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000–2008*

- Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969–1970, 1975–2008*
- Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2008*
- Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2008*, %
- Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2008*
- Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2008*
- Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2008*
- Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2008*
- Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter före abort 1980, 1985, 1989–2008*, %
- Tabell 9: Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2008*, %
- Tabell 10: Abortmetoder 2000–2008*

- Table 1: Induced abortions by age, 1969–1970, 1975–2008*
- Table 2. Induced abortions by hospital district and age, 2008*
- Table 3: Indications for induced abortion, 1970–2008*, %
- Table 4: Induced abortions by indication, 2008*
- Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985–2008*
- Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987–2008*
- Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987–2008*
- Table 8: Contraceptives used by abortion patients before abortion, 1980, 1985, 1989–2008*, %
- Table 9. Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983–2008*, %
- Table 10: Methods for induced abortion, 2000–2008*

***) Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 1: Raskaudenkeskeykset ikäryhmittäin vuosina 1969–1970, 1975–2008*

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969–1970, 1975–2008*

Table 1: Induced abortions by age, 1969–1970, 1975–2008*

Vuosi År Year	Keskeytysiä Aborter Abortions	Per 1000 elävästä syntynytä levande födda live births	Ikäryhmittäin tuhatta vastaan ikäistä naista kohti ⁽¹⁾ Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma åldrar By age group per 1 000 women of the same age							
			15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 ⁽³⁾	15-49
1969	8 175	121,2	3,6	8,1	10,2	10,8	9,9	6,9	1,0	7,0
1970	14 757	228,6	8,3	15,4	17,8	18,0	16,6	11,8	1,6	12,7
1975	21 547	327,9	21,2	26,0	22,0	17,6	17,1	13,2	1,7	17,9
1976	19 818	296,5	20,4	24,7	17,5	16,0	15,8	11,8	2,3	16,4
1977	17 772	270,7	19,5	22,0	16,1	14,6	13,4	10,3	1,8	14,7
1978	16 928	264,6	19,8	21,4	15,4	13,0	11,7	9,9	1,6	14,0
1979	15 849	249,9	19,5	20,2	13,6	12,1	10,4	9,1	1,7	13,0
1980	15 037	238,4	19,4	19,7	12,2	11,0	10,3	8,2	1,7	12,3
1981	14 120	222,5	17,9	18,3	11,5	10,2	9,9	7,9	1,4	11,5
1982	13 861	209,7	17,9	18,7	11,0	9,8	9,5	6,9	1,3	11,2
1983	13 323	199,2	21,2	16,4	10,3	9,3	8,3	5,4	0,8	10,7
1984	13 640	209,6	20,9	17,1	10,9	9,7	8,8	5,4	0,8	10,9
1985	13 787	219,6	20,7	17,6	11,3	9,8	9,1	5,1	0,8	11,0
1986	13 316	219,6	19,5	18,3	11,0	10,0	8,6	4,8	0,6	10,6
1987	12 986	217,4	17,5	18,4	11,8	9,3	8,1	5,7	0,9	10,3
1988	12 738	201,6	16,7	19,4	12,1	9,1	7,9	5,1	0,8	10,1
1989	12 646	199,7	16,7	18,7	12,9	9,4	7,8	5,0	0,8	10,1
1990	12 217	186,6	15,6	18,3	12,5	9,8	7,4	4,7	0,9	9,7
1991	11 737	179,7	13,5	17,5	13,1	9,7	7,6	4,4	0,8	9,3
1992	11 069	166,0	12,4	16,5	12,8	9,8	7,2	3,9	0,7	8,7
1993	10 375	160,2	10,9	15,5	12,8	9,7	6,9	3,4	0,5	8,2
1994	10 013	154,3	10,7	14,5	13,0	10,0	6,4	3,2	0,5	7,9
1995	9 872	157,1	11,0	14,5	12,9	9,6	6,6	3,0	0,4	7,8
1996	10 423	172,3	11,4	15,1	13,8	11,0	7,1	2,9	0,4	8,3
1997	10 250	173,6	12,0	14,6	13,3	10,9	7,1	2,9	0,3	8,2
1998	10 751	189,3	13,0	15,1	13,6	11,7	7,7	3,0	0,2	8,7
1999	10 837	188,6	14,1	15,7	13,7	10,9	7,7	2,9	0,3	8,8
2000	10 932	193,3	14,8	16,0	13,0	11,2	7,9	3,0	0,2	9,0
2001	10 740	192,5	15,5	15,1	13,1	10,9	7,6	3,3	0,2	8,9
2002	10 976	198,4	16,4	16,5	12,4	11,0	7,7	3,3	0,2	9,2
2003	10 768	190,8	15,4	16,9	12,1	10,9	8,1	2,9	0,3	9,1
2004	11 165	193,9	15,8	18,4	12,6	10,7	8,1	3,2	0,2	9,4
2005	10 973	190,4	14,9	18,2	12,8	10,3	8,0	3,4	0,2	9,3
2006	10 693	181,7	14,1	18,2	12,3	9,9	8,0	3,3	0,2	9,1
2007	10 542	179,5	13,3	18,2	12,7	10,1	7,7	3,0	0,2	9,0
2008*	10 230	171,9	12,5	17,7	12,6	9,7	7,3	3,1	0,4	8,8

1) Vuosina 1969–1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä

Åren 1969–1985: ålder=operationsår minus födelseår, från år 1986 ålder på operationsdagen.

Years 1969–1985: age= year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

2) Alle 20-vuotiaiden keskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15–19 år.

Number of abortions among under 20-year-olds per thousand women aged 15–19.

3) 45 vuotta täytyneiden keskeytykset tuhatta 45-49-vuotiasta naista kohden.

Antal aborter bland kvinnor som fyllt 45 år per tusen kvinnor i åldern 45–49 år.

Number of abortions among aged 45 years or more per thousand women aged 45–49.

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittään 2008*

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2008*

Table 2. Induced abortions by hospital district and age, 2008*

Sairaanhoitopiiri ⁽¹⁾ Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Ikäryhmittään tuhatta vastaan ikäistä naista kohti Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma åldrar By age group per 1 000 women of the same age							
	15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 ⁽³⁾	15-49
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	14,6	21,6	13,8	10,4	7,8	3,8	0,5	9,9
Helsinki - Helsingfors	17,9	22,3	13,1	10,4	9,3	4,3	0,6	11,1
Uusimaa - Nyland	13,0	20,9	14,5	10,4	6,9	3,5	0,5	9,2
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	12,1	18,2	9,3	8,5	7,8	3,0	0,3	8,3
Satakunta - Satakunta	14,4	18,3	16,1	7,6	6,0	3,0	0,4	8,9
Kanta-Häme - Centrale Tavastland	11,0	13,5	12,8	9,6	6,7	2,7	0,3	7,6
Pirkanmaa - Birkaland	12,0	15,7	11,5	9,2	6,7	3,0	0,4	8,3
Päijät-Häme - Päijät-Häme	15,4	21,2	14,1	13,7	7,8	2,5	0,3	10,1
Kymenlaakso - Kymmenedalen	12,1	18,5	16,4	12,9	7,8	2,9	0,2	9,2
Etelä-Karjala - Södra Karelen	12,2	11,7	9,9	7,6	8,8	3,4	0,5	7,3
Etelä-Savo - Södra Savolax	8,9	10,0	9,6	4,6	3,5	2,9	0,0	5,2
Itä-Savo - Östra Savolax	13,1	19,2	14,9	8,6	10,6	1,9	0,5	9,0
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	11,6	15,1	9,7	8,3	7,7	2,7	0,2	7,5
Pohjois-Savo - Norra Savolax	10,5	13,5	15,0	8,0	7,4	2,6	0,1	7,7
Keski-Suomi - Mellersta Finland	10,0	13,9	10,9	6,9	5,7	2,2	0,3	7,1
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	7,2	9,8	8,7	9,5	5,6	3,4	0,7	6,1
Vaasa - Vasa	11,9	14,3	10,4	7,6	10,7	2,4	0,2	8,2
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	9,6	17,4	11,6	9,4	5,6	1,7	0,4	7,8
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	10,6	16,3	11,3	10,5	6,4	2,3	0,4	8,3
Kainuu - Kajanaland	11,4	17,2	11,8	9,5	5,8	4,0	0,0	8,0
Länsi-Pohja - Länsi-Pohja	13,9	21,4	12,5	13,5	7,6	1,6	0,0	9,7
Lappi - Lappland	16,0	22,3	18,6	12,5	7,7	3,0	0,6	11,0
Ahvenanmaa - Åland	17,8	24,5	19,9	15,1	4,6	5,7	0,0	11,4
Yhteensä - Totalt - <i>Total</i>	12,5	17,7	12,6	9,7	7,3	3,1	0,4	8,8

1) **Potilaan asuinpaikan mukaan.** Efter hemkommun. *According to patient's domicile.*

2) **Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset tuhatta 15–19-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15–19 år.

Number of abortions among under 20-year-olds per thousand women aged 15–19.

3) **45 vuotta täyttäneiden keskeytykset tuhatta 45-49-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor som fyllt 45 år per tusen kvinnor i åldern 45–49 år.

Number of abortions among aged 45 years or more per thousand women aged 45–49.

***) Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970–2008*, %

Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2008*, %

Table 3: Indications for induced abortion, 1970–2008*, %

Vuosi År Year	Lääke- tieteel- linen Medicinsk Medical	Sosi- aalinen Social Social	Eettinen Etisk Criminal	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Täyttänyt 40 v. Över 40 år Age 40 or more	Synnyttänyt 4 lasta Fött 4 barn Given birth to 4 children	Mahdollinen sikiövaario Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaario Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoittu- neisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä Totalt Total	
1970 ⁽¹⁾	44,3	33,0	0,2	3,9	6,1	11,6	0,8	..	0,1	100	14 757
1971 ⁽²⁾	20 622
1972 ⁽²⁾	22 146
1973 ⁽³⁾	9,2	71,5	0,1	4,2	8,5	6,0	0,4	..	0,2	100	23 362
1974 ⁽³⁾	7,7	73,6	0,1	3,3	8,6	6,4	0,3	..	0,1	100	22 846
1975 ⁽³⁾	6,0	74,8	..	5,2	7,8	4,8	1,1	..	0,3	100	21 547
1976 ⁽³⁾	5,4	76,2	..	5,4	7,8	4,1	0,7	..	0,4	100	19 818
1977	5,4	76,4	0,0	6,4	7,1	3,9	0,7	..	0,2	100	17 772
1978	4,3	77,5	0,0	6,9	7,6	3,0	0,6	..	0,2	100	16 928
1979	3,0	78,1	0,0	7,0	8,0	2,6	0,5	..	0,2	100	15 849
1980	3,5	77,6	0,0	7,5	7,6	2,2	1,0	..	0,2	100	15 037
1981	3,4	78,6	0,0	7,0	7,5	2,4	0,9	..	0,2	100	14 120
1982	3,3	79,7	0,1	7,1	6,9	2,0	0,7	..	0,2	100	13 861
1983	3,0	80,7	0,1	6,9	6,7	1,8	0,6	..	0,2	100	13 323
1984	3,1	81,3	0,0	6,1	6,6	2,1	0,7	..	0,1	100	13 640
1985	2,4	82,9	0,1	5,5	6,2	2,1	0,6	..	0,1	100	13 787
1986	1,9	84,1	0,0	4,8	6,1	2,1	0,8	..	0,1	100	13 316
1987	1,7	83,4	..	4,8	7,1	1,8	0,1	..	1,1	100	12 986
1988	1,4	84,5	0,1	4,1	7,2	1,6	1,1	..	0,1	100	12 738
1989	1,1	84,0	0,0	4,0	7,7	1,7	1,4	..	0,1	100	12 646
1990	0,8	83,9	0,0	4,5	7,4	1,8	1,5	..	0,1	100	12 217
1991	0,8	84,3	0,1	4,4	7,3	1,7	1,4	..	0,1	100	11 737
1992	0,8	85,3	0,0	4,3	6,2	1,6	1,7	0,0	0,0	100	11 069
1993	0,6	85,5	0,0	4,2	6,0	1,9	1,6	0,0	0,0	100	10 375
1994	0,5	85,4	0,0	3,8	6,0	2,0	2,2	0,0	0,0	100	10 013
1995	0,5	86,1	0,0	3,9	5,5	2,0	2,0	0,1	0,0	100	9 872
1996	0,4	86,8	0,0	3,7	4,8	2,3	2,1	0,0	0,0	100	10 423
1997	0,3	86,8	0,0	4,6	4,4	2,0	1,9	0,0	0,0	100	10 250
1998	0,3	85,8	0,0	5,4	4,2	2,2	0,6	1,5	0,0	100	10 751
1999	0,2	85,8	0,1	6,1	4,2	1,7	0,7	1,2	0,0	100	10 837
2000	0,1	84,3	0,1	7,5	3,9	1,8	1,0	1,2	0,0	100	10 932
2001	0,4	84,7	0,1	7,1	4,2	2,0	0,9	1,2	0,0	101	10 819 ⁽⁴⁾
2002	0,5	86,2	0,1	6,8	3,8	2,1	0,6	1,6	0,0	102	11 163
2003	0,5	86,6	0,1	6,7	3,6	2,0	1,1	1,4	0,0	102	10 970
2004	0,4	88,2	0,1	5,9	3,4	2,0	0,9	1,5	0,1	102	11 431
2005	0,5	86,8	0,1	6,2	4,0	2,2	0,9	1,8	0,0	103	11 212
2006	0,4	88,5	0,0	6,0	3,7	2,0	1,0	1,8	0,0	103	10 867
2007	0,5	90,4	0,1	5,3	3,4	2,0	0,6	2,3	0,0	105	10 783
2008*	0,4	91,0	0,1	4,9	3,7	1,9	0,7	2,1	0,0	105	10 739

1) Nykyisen lain aikana. Under den gällande lagen. *Under the current law.*

2) Vain kokonaismäärä tilastoituu. Statistik endast över totalt antal. *Statistics on available total number only.*

3) Perustuu otokseen. Grundar sig på sampel. *Based on a sample.*

4) Useampi peruste mahdollinen v. 2001 alkaen. Mera än en indikation möjlig sedan år 2001.

More than one indication possible since 2001.

* Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteenvaakaan 2008*

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2008*
Table 4: Induced abortions by indication, 2008*

Siviilisääty, ikä ja synnytysten määrä Civilstånd, ålder och antal förlossningar Marital status, age and number of deliveries	Peruste - Indikation - Indication										Yhteensä ¹⁾ Totalt Total
	Lääketiet. Medicinsk Medical	Sosiaa-linen Social Social	Eettinen Etisk Criminal	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Yli 40 v. Over 40 år Age 40 or more	4 lasta 4 barn 4 children	Mahdollinen sikiövaario Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaario Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoittu- neisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children		
Siviilisääty - Civilstånd - Marital status											
Naimisissa - Gift - Married	19	1 659	3	-	172	107	40	126	-	2 126	
Naimaton - Ogift - Single	17	6 936	7	501	111	57	31	80	3	7 743	
Leski - Änka - Widowed	-	20	-	-	6	1	-	-	-	27	
Eronnut - Frånskild - Divorced	3	691	4	-	93	33	2	8	2	836	
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7	
Yhteensä - Totalt - Total	39	9 313	14	501	382	198	73	214	5	10 739	
Ikä - Ålder - Age²⁾											
-13	-	-	1	3	-	-	-	-	-	3	
14	-	7	-	34	-	-	-	-	-	41	
15	-	48	-	115	-	-	-	-	-	163	
16	-	160	-	303	-	-	-	-	-	463	
17	1	390	-	46	-	-	-	1	-	437	
18	-	535	1	-	-	-	-	-	-	536	
19	2	635	-	-	-	-	2	1	-	640	
20-24	10	2 762	3	-	-	4	6	24	2	2 811	
25-29	7	1 975	4	-	-	26	15	49	-	2 076	
30-34	5	1 444	3	-	-	63	21	57	2	1 595	
35-39	10	1 029	1	-	-	67	16	48	-	1 171	
40-44	4	293	1	-	332	36	12	31	1	710	
45-	-	35	-	-	50	2	1	3	-	91	
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yhteensä - Totalt - Total	39	9 313	14	501	382	198	73	214	5	10 739	
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries											
0	14	4 950	7	499	39	-	27	85	2	5 623	
1	10	1 743	3	2	69	-	26	77	-	1 930	
2	7	1 637	1	-	136	1	14	33	1	1 830	
3	6	747	2	-	91	12	3	13	2	876	
4	1	154	1	-	18	109	-	2	-	285	
5	1	53	-	-	16	52	2	3	-	127	
6	-	20	-	-	7	16	1	1	-	45	
7	-	4	-	-	4	5	-	-	-	13	
8	-	1	-	-	1	2	-	-	-	4	
9-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	6	
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yhteensä - Totalt - Total	39	9 313	14	501	382	198	73	214	5	10 739	

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.

2) Ikä toimenpiste suorituspäivänä. Ålder på ingreppsdagen. Age on the day of operation.

* Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter
Preliminary information.

Taulukko 5: Raskaudenkeskeykset raskauden keston mukaan 1985–2008*

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2008*

Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985–2008*

Viikkoja - Veckor - Weeks

N	-7	8	9	10	11	12-	Tuntematon		Yhteensä Totalt Total
							Okänt <i>Unknown</i>	Unknown	
1985	4 438	3 073	2 637	1 982	943	712	2	13 787	
1986	4 542	2 980	2 459	1 783	869	682	1	13 316	
1987	4 130	2 951	2 486	1 765	962	679	13	12 986	
1988	4 170	2 722	2 367	1 828	982	667	2	12 738	
1989	4 138	2 693	2 448	1 798	858	707	4	12 646	
1990	4 074	2 693	2 285	1 680	812	671	2	12 217	
1991	4 266	2 565	2 126	1 466	669	645	-	11 737	
1992	4 131	2 374	1 987	1 340	628	609	-	11 069	
1993	3 996	2 306	1 809	1 158	550	556	-	10 375	
1994	4 096	2 140	1 615	1 096	461	605	-	10 013	
1995	4 018	2 089	1 661	1 079	436	589	-	9 872	
1996	4 199	2 273	1 641	1 102	600	604	4	10 423	
1997	4 307	2 253	1 556	1 087	465	581	1	10 250	
1998	4 702	2 293	1 596	1 075	459	623	3	10 751	
1999	4 771	2 318	1 549	1 098	456	644	1	10 837	
2000	4 977	2 233	1 583	1 036	431	672	-	10 932	
2001	5 843	1 727	1 214	915	358	683	-	10 740	
2002	6 181	1 698	1 096	877	383	741	-	10 976	
2003	6 310	1 623	959	783	377	716	-	10 768	
2004	6 531	1 714	992	739	409	780	-	11 165	
2005	6 546	1 674	916	686	345	804	2	10 973	
2006	6 428	1 605	884	643	342	785	6	10 693	
2007	6 340	1 661	835	623	325	749	9	10 542	
2008*	6 113	1 626	785	596	382	728	-	10 230	
%									
1985	32,2	22,3	19,1	14,4	6,8	5,2	0,0	100	
1986	34,1	22,4	18,5	13,4	6,5	5,1	0,0	100	
1987	31,8	22,7	19,1	13,6	7,4	5,3	0,1	100	
1988	32,7	21,4	18,6	14,4	7,7	5,3	0,0	100	
1989	32,8	21,3	19,4	14,2	6,8	5,4	0,0	100	
1990	33,3	22,0	18,7	13,8	6,6	5,6	0,0	100	
1991	36,3	21,9	18,1	12,5	5,7	5,4	-	100	
1992	37,3	21,4	18,0	12,1	5,7	5,4	-	100	
1993	38,5	22,2	17,4	11,2	5,3	5,3	-	100	
1994	40,9	21,4	16,1	10,9	4,6	5,9	-	100	
1995	40,7	21,2	16,8	10,9	4,4	6,0	-	100	
1996	40,3	21,8	15,7	10,6	5,8	5,7	0,0	100	
1997	42,0	22,0	15,2	10,6	4,5	5,8	0,0	100	
1998	43,8	21,3	14,8	10,0	4,3	5,9	0,0	100	
1999	44,0	21,4	14,3	10,1	4,2	5,8	0,0	100	
2000	45,5	20,4	14,5	9,5	3,9	6,1	-	100	
2001	54,4	16,1	11,3	8,5	3,3	6,4	-	100	
2002	56,3	15,5	10,0	8,0	3,5	6,6	-	100	
2003	58,6	15,1	8,9	7,3	3,5	6,7	-	100	
2004	58,5	15,4	8,9	6,6	3,7	6,9	-	100	
2005	59,6	15,3	8,3	6,3	3,1	7,4	0,0	100	
2006	60,1	15,0	8,3	6,0	3,2	7,4	0,1	100	
2007	60,2	15,8	7,9	5,9	3,1	7,1	0,1	100	
2008*	59,8	15,9	7,7	5,8	3,7	7,1	-	100	

***) Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 6: Raskaudenkeskeykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987–2008*

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2008*

Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987–2008*

Aikaisemmat synnytykset

Tidigare förlossningar

Previous deliveries

N	0	1	2	3	4	5-	Tuntematon Okänt <i>Unknown</i>	Yhteensä Totalt <i>Total</i>
1987	6 468	2 190	2 649	1 207	321	81	70	12 986
1988	6 544	2 165	2 552	1 105	283	51	38	12 738
1989	6 418	2 194	2 482	1 118	289	75	70	12 646
1990	6 149	2 111	2 481	1 096	287	65	28	12 217
1991	5 698	2 143	2 438	1 055	245	81	77	11 737
1992	5 334	2 133	2 254	991	262	77	18	11 069
1993	4 832	2 031	2 250	904	248	90	20	10 375
1994	4 596	1 957	2 171	945	239	94	11	10 013
1995	4 689	1 908	2 055	900	229	90	1	9 872
1996	4 877	1 986	2 195	998	287	78	2	10 423
1997	4 984	1 833	2 153	953	254	73	-	10 250
1998	5 243	1 991	2 146	1 012	274	85	-	10 751
1999	5 432	1 951	2 133	984	245	92	-	10 837
2000	5 672	1 903	2 064	938	270	85	-	10 932
2001	5 497	1 962	2 011	913	249	107	1	10 740
2002	5 744	1 957	2 026	885	270	94	-	10 976
2003	5 685	1 920	1 924	880	256	103	-	10 768
2004	5 914	2 057	2 029	821	247	97	-	11 165
2005	5 830	2 016	1 877	857	273	120	-	10 973
2006	5 600	2 030	1 834	872	260	97	-	10 693
2007	5 528	2 040	1 858	762	246	107	1	10 542
2008*	5 354	1 905	1 782	841	215	133	-	10 230
%								
1987	49,8	16,9	20,4	9,3	2,5	0,6	0,5	100
1988	51,4	17,0	20,0	8,7	2,2	0,4	0,3	100
1989	50,8	17,3	19,6	8,8	2,3	0,6	0,6	100
1990	50,3	17,3	20,3	9,0	2,3	0,5	0,2	100
1991	48,5	18,3	20,8	9,0	2,1	0,7	0,7	100
1992	48,2	19,3	20,4	9,0	2,4	0,7	0,2	100
1993	46,6	19,6	21,7	8,7	2,4	0,9	0,2	100
1994	45,9	19,5	21,7	9,4	2,4	0,9	0,1	100
1995	47,5	19,3	20,8	9,1	2,3	0,9	0,0	100
1996	46,8	19,1	21,1	9,6	2,8	0,7	0,0	100
1997	48,6	17,9	21,0	9,3	2,5	0,7	-	100
1998	48,8	18,5	20,0	9,4	2,5	0,8	-	100
1999	50,1	18,0	19,7	9,1	2,3	0,8	-	100
2000	51,9	17,4	18,9	8,6	2,5	0,8	-	100
2001	51,2	18,3	18,7	8,5	2,3	1,0	0,0	100
2002	52,3	17,8	18,5	8,1	2,5	0,9	-	100
2003	52,8	17,8	17,9	8,2	2,4	1,0	-	100
2004	53,0	18,4	18,2	7,4	2,2	0,9	-	100
2005	53,1	18,4	17,1	7,8	2,5	1,1	-	100
2006	52,4	19,0	17,2	8,2	2,4	0,9	-	100
2007	52,4	19,4	17,6	7,2	2,3	1,0	0,0	100
2008*	52,3	18,6	17,4	8,2	2,1	1,3	-	100

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987–2008*

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2008*

Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987–2008*

Aikaisemmat keskeytykset

Tidigare aborter

Previous abortions

N	0	1	2	3	4	5-	Tuntematon Okänt Unknown	Yhteensä Totalt Total
1987	9 454	2 529	537	144	33	13	277	12 986
1988	9 320	2 485	550	114	32	9	228	12 738
1989	9 152	2 526	547	124	28	20	249	12 646
1990	8 904	2 487	573	120	32	19	82	12 217
1991	8 332	2 474	596	167	36	18	114	11 737
1992	7 701	2 455	620	147	45	23	78	11 069
1993	7 186	2 299	591	148	41	17	93	10 375
1994	6 930	2 133	602	141	44	29	134	10 013
1995	6 911	2 155	578	154	47	24	3	9 872
1996	7 247	2 274	663	174	35	28	2	10 423
1997	7 172	2 185	626	182	44	27	14	10 250
1998	7 580	2 262	642	182	58	27	-	10 751
1999	7 775	2 185	624	171	52	29	1	10 837
2000	7 770	2 257	649	172	55	29	-	10 932
2001	7 597	2 250	621	189	48	33	2	10 740
2002	7 704	2 278	687	218	49	38	2	10 976
2003	7 356	2 384	701	198	84	45	-	10 768
2004	7 615	2 413	788	232	67	49	1	11 165
2005	7 469	2 367	764	237	74	60	2	10 973
2006	7 134	2 406	751	259	85	57	1	10 693
2007	6 863	2 398	835	281	106	54	5	10 542
2008*	6 627	2 408	774	264	96	61	-	10 230
%								
1987	72,8	19,5	4,1	1,1	0,3	0,1	2,1	100
1988	73,2	19,5	4,3	0,9	0,3	0,1	1,8	100
1989	72,4	20,0	4,3	1,0	0,2	0,2	2,0	100
1990	72,9	20,4	4,7	1,0	0,3	0,2	0,7	100
1991	71,0	21,1	5,1	1,4	0,3	0,2	1,0	100
1992	69,6	22,2	5,6	1,3	0,4	0,2	0,7	100
1993	69,3	22,2	5,7	1,4	0,4	0,2	0,9	100
1994	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100
1995	70,0	21,8	5,9	1,6	0,5	0,2	0,0	100
1996	69,5	21,8	6,4	1,7	0,3	0,3	0,0	100
1997	70,0	21,3	6,1	1,8	0,4	0,3	0,1	100
1998	70,5	21,0	6,0	1,7	0,5	0,3	-	100
1999	71,7	20,2	5,8	1,6	0,5	0,3	0,0	100
2000	71,1	20,6	5,9	1,6	0,5	0,3	-	100
2001	70,7	20,9	5,8	1,8	0,4	0,2	0,0	100
2002	70,2	20,7	6,3	2,0	0,5	0,2	0,0	100
2003	68,3	22,1	6,5	1,8	0,8	0,4	-	100
2004	68,2	21,6	7,1	2,1	0,6	0,4	0,0	100
2005	68,1	21,6	7,0	2,2	0,7	0,5	0,0	100
2006	66,7	22,5	7,0	2,4	0,8	0,5	0,0	100
2007	65,1	22,7	7,9	2,7	1,0	0,5	0,0	100
2008*	64,8	23,5	7,6	2,6	0,9	0,5	-	100

***) Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy ennen keskeyttystä 1980, 1985, 1989–2008*, %

Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter före abort 1980, 1985, 1989–2008*, %
Table 8: Contraceptives used by abortion patients before abortion, 1980, 1985, 1989–2008*, %

	E-tabletti ¹⁾ P-piller Pill	Kohdunsisäinen hormoniehkäisin Hormonspiral Hormone releasing IUD	Kierukka Spiral IUD	Kondomi Kondom Condom	Sterilointi Sterilisering Sterilisation	Muu Annat Other	Ei mitään Ingenting Nothing	Tuntematon Okänt Unknown	Jälkiehkäisy ²⁾ Akut p-piller Post-coital oral contraceptive	Yhteensä ³⁾ Totalt Total
1980	4,6	..	10,9	41,8	..	5,0	32,3	5,4	..	100,0
1985	5,9	..	8,0	41,6	..	6,1	33,5	4,9	..	100,0
1989	7,9	..	5,1	46,0	..	4,0	35,8	4,1	..	102,9
1990	7,7	..	5,2	45,7	..	3,9	35,6	4,5	..	102,6
1991	8,3	..	5,2	44,1	..	3,9	36,7	4,7	..	102,9
1992	8,1	..	4,6	46,9	0,5	3,3	34,5	4,6	..	102,5
1993	7,8	..	4,8	47,3	0,7	2,8	34,0	5,5	..	100,0
1994	7,1	..	3,8	47,1	0,5	2,7	35,9	5,7	..	102,8
1995	7,8	..	3,5	47,7	0,5	3,2	34,4	6,0	..	103,1
1996	7,4	..	3,1	49,1	0,4	2,9	33,6	5,9	..	100,0
1997	7,8	..	2,4	49,9	0,5	3,1	32,8	6,2	..	100,0
1998	7,2	0,2	1,9	50,0	0,6	2,2	35,1	5,0	1,0	103,2
1999	7,9	0,1	1,7	50,5	0,6	1,9	35,1	4,6	1,3	103,7
2000	8,5	0,2	1,5	49,7	0,4	1,9	35,5	4,7	0,9	103,3
2001	8,6	0,1	1,4	49,9	0,4	1,7	35,7	3,5	1,2	102,5
2002	9,1	0,2	1,3	49,7	0,4	1,7	35,7	4,8	1,5	104,4
2003	9,8	0,3	1,0	47,8	0,2	2,4	35,6	5,9	2,3	105,3
2004	9,8	0,2	1,0	46,6	0,3	3,4	36,4	4,6	2,1	104,4
2005	9,2	0,3	0,9	46,4	0,4	3,6	37,0	4,6	2,7	105,1
2006	9,4	0,2	0,7	45,3	0,3	3,1	38,4	5,1	2,7	105,2
2007	9,6	0,3	0,9	44,1	0,3	3,1	38,6	6,3	3,1	106,3
2008*	10,6	0,4	0,7	43,5	0,2	3,0	37,2	7,7	3,0	106,3

1) Vuodesta 1998 E-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-piller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.

2) Ei muuta mainittu. Inga andra nämnts. No mention of other contraceptive.

3) Useampi menetelmä mahdollinen. Flera än en metod möjliga. More than one method possible.

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 9. Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983–2008*, %

Tabell 9. Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2008*, %

Table 9. Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983–2008*, %

	E-tabletti¹⁾ P-piller Pill	Kohdunisäinen hormoniehääsin Hormonspiral Hormone releasing IUD	Kierukka Spiral IUD	Kondomi Kondom Condom	Sterilointi Sterilisering Sterilisation	Muu Annat Other	Ei mitään Ingenting Nothing	Tuntematon Okänt Unknown	Yhteensä Totalt Total
1983	33,1	..	47,6	2,4	0,0	6,3	1,3	9,4	100,0
1984	29,2	..	48,2	2,0	0,0	9,6	1,3	9,7	100,0
1985	26,5	..	48,0	2,2	0,0	12,0	1,1	10,2	100,0
1986	51,1	..	23,6	2,7	0,0	11,9	1,2	9,5	100,0
1987	53,0	..	22,9	3,0	0,0	12,4	1,2	9,2	100,0
1988	56,1	..	21,9	3,0	0,0	11,0	1,3	8,0	100,0
1989	57,7	..	19,5	3,2	0,0	11,2	1,3	8,3	100,0
1990	57,5	..	20,3	3,2	0,0	10,6	1,6	8,0	100,0
1991	54,8	..	22,5	2,6	0,1	10,5	1,4	9,3	100,0
1992	54,9	..	24,4	2,6	6,9	2,7	0,9	8,4	100,0
1993	57,0	..	22,7	3,0	8,0	1,3	1,1	7,9	100,0
1994	57,4	..	21,9	2,7	8,1	1,1	1,4	8,5	100,0
1995	56,6	..	21,9	3,1	8,1	0,8	1,4	8,5	100,0
1996	53,7	..	22,8	3,5	8,9	0,5	1,2	9,4	100,0
1997	57,6	..	21,7	3,2	7,9	0,8	1,2	8,4	100,0
1998	59,6	5,6	15,6	4,3	8,3	0,8	1,3	6,5	100,0
1999	60,4	7,0	15,1	3,8	7,2	1,0	1,1	6,4	100,0
2000	63,3	7,2	13,7	3,5	6,2	0,8	1,4	6,4	100,0
2001	61,7	8,1	14,2	3,6	6,0	0,7	1,3	5,9	100,0
2002	61,6	9,1	12,8	3,6	5,7	1,0	1,4	6,9	100,0
2003	57,6	9,6	11,8	3,3	4,3	7,0	1,7	7,2	100,0
2004	53,5	10,0	11,5	3,6	3,8	11,8	1,3	7,1	100,0
2005	53,6	11,5	10,9	3,1	3,5	11,5	1,3	7,2	100,0
2006	52,6	13,5	9,9	3,1	3,0	12,8	1,2	7,2	100,0
2007	53,0	13,8	9,4	3,5	2,7	12,4	1,3	7,8	100,0
2008*	53,8	15,1	8,9	2,6	2,7	11,6	1,2	8,8	100,0

1) Vuodesta 1998 E-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-piller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000–2008*

Tabell 10: Abortmetoder 2000–2008*

Table 10: Methods for induced abortion, 2000–2008*

	Laajennus, imukaavinta	Laajennus, tyhjennys, imukaavinta	Varhaisimu	Abortiivaine	Prostaglandiini	Mifegyne	Keisari-leikkaus	Muu	Tuntematon	Yhteensä
	Dilatation, vakuum-aspiration	Dilatation, exeres, vakuum-aspiration	Tidig aspiration	Abortmedel	tai muu lääke Prostaglandin	Mifegyne	Kejsarsnitt Caesarean section	Annan Other	Okänd Unknown	Totalt Total
	Dilation, suction	Dilation, evacuation, suction	Early suction	Abortion-inducing drug	eller annat läkemedel Prostaglandin or other drug					
Yhteensä - Totalt - Total/										
N										
2000	9 230	339	191	485	246	430	3	8	-	10 932
2001	7 206	232	159	532	400	2 195	5	11	-	10 740
2002	6 015	139	142	607	413	3 653	3	4	-	10 976
2003	5 006	112	104	658	541	4 340	2	5	-	10 768
2004	4 575	125	83	720	703	4 948	2	8	1	11 165
2005	3 741	97	94	750	472	5 808	-	9	2	10 973
2006	3 141	83	67	762	485	6 138	1	10	6	10 693
2007	2 711	41	72	717	252	6 732	-	7	10	10 542
2008*	2 141	31	61	712	181	7 099	-	5	-	10 230
%										
2000	84,4	3,1	1,7	4,4	2,3	3,9	0,0	0,1	-	100
2001	67,1	2,2	1,5	5,0	3,7	20,4	0,0	0,1	-	100
2002	54,8	1,3	1,3	5,5	3,8	33,3	0,0	0,0	-	100
2003	46,5	1,0	1,0	6,1	5,0	40,3	0,0	0,0	-	100
2004	41,0	1,1	0,7	6,4	6,3	44,3	0,0	0,1	0,0	100
2005	34,1	0,9	0,9	6,8	4,3	52,9	-	0,1	0,0	100
2006	29,4	0,8	0,6	7,1	4,5	57,4	0,0	0,1	0,1	100
2007	25,7	0,4	0,7	6,8	2,4	63,9	-	0,1	0,1	100
2008*	20,9	0,3	0,6	7,0	1,8	69,4	-	0,0	-	100
Ennen 13. viikkoa / Före vecka 13 / Before 13th week										
N										
2000	9 141	284	191	14	207	419	-	4	-	10 260
2001	7 122	197	159	22	372	2 180	-	5	-	10 057
2002	5 954	109	142	15	370	3 645	-	-	-	10 235
2003	4 962	87	104	17	540	4 340	-	2	-	10 052
2004	4 528	99	83	19	703	4 948	1	3	1	10 385
2005	3 688	84	94	18	472	5 807	-	4	-	10 167
2006	3 116	72	67	21	484	6 138	-	4	-	9 902
2007	2 672	35	72	19	252	6 732	-	2	-	9 784
2008*	2 121	25	61	14	181	7 098	-	2	-	9 502
%										
2000	89,1	2,8	1,9	0,1	2,0	4,1	-	0,0	-	100
2001	70,8	2,0	1,6	0,2	3,7	21,7	-	0,0	-	100
2002	58,2	1,1	1,4	0,1	3,6	35,6	-	-	-	100
2003	49,4	0,9	1,0	0,2	5,4	43,2	-	0,0	-	100
2004	43,6	1,0	0,8	0,2	6,8	47,6	0,0	0,0	0,0	100
2005	36,3	0,8	0,9	0,2	4,6	57,1	-	0,0	-	100
2006	31,5	0,7	0,7	0,2	4,9	62,0	-	0,0	-	100
2007	27,3	0,4	0,7	0,2	2,6	68,8	-	0,0	-	100
2008*	22,3	0,3	0,6	0,1	1,9	74,7	-	0,0	-	100
13. viikolla tai sen jälkeen /vecka 13 eller därefter / 13th week of thereafter										
N										
2000	89	55	-	471	39	11	3	4	-	672
2001	84	35	-	510	28	15	5	6	-	683
2002	61	30	-	592	43	8	3	4	-	741
2003	44	25	-	641	1	-	2	3	-	716
2004	47	26	-	701	-	-	1	5	-	780
2005	53	13	-	732	-	1	-	5	-	804
2006	25	11	-	741	1	-	1	6	-	785
2007	39	6	-	698	-	-	-	5	1	749
2008*	20	6	-	698	-	1	-	3	-	728
%										
2000	13,2	8,2	-	70,1	5,8	1,6	0,4	0,6	-	100
2001	12,3	5,1	-	74,7	4,1	2,2	0,7	0,9	-	100
2002	8,2	4,0	-	79,9	5,8	1,1	0,4	0,5	-	100
2003	6,1	3,5	-	89,5	0,1	-	0,3	0,4	-	100
2004	6,0	3,3	-	89,9	-	-	0,1	0,6	-	100
2005	6,6	1,6	-	91,0	-	0,1	-	0,6	-	100
2006	3,2	1,4	-	94,4	0,1	-	0,1	0,8	-	100
2007	5,2	0,8	-	93,2	-	-	-	0,7	0,1	100
2008*	2,7	0,8	-	95,9	-	0,1	-	0,4	-	100

*Ennakkotieto.

*Preliminära uppgifter.

*Preliminary information.

Raskaudenkeskeytystilaston laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi

Raskaudenkeskeytystilasto sisältää tietoja raskaudenkeskeytysten lukumäärästä vuosittain. Keskeytykset esitetään myös ikäryhmittäin ja sairaanhoitopiireittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti.

Lisäksi tilastotiedotteessa esitetään lukumäärätietoja raskaudenkeskeytysten perusteista, suorittamisajankohdasta raskausviikon mukaan, potilaiden aikaisemmista keskeytyksistä ja synnytyksistä, käytetyistä raskaudenkeskeytsmenetelmistä sekä potilaiden käyttämistä ja heille suunnitellista ehkäisymenetelmistä.

Tiedote on tarkoitettu lisääntymisterveyden kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, joilla on tarve saada nopeasti mahdollisimman ajantasaista tietoa raskaudenkeskeyksistä ja steriloinneista.

Tilastotiedotteiden tekstiosassa on selitetty käytetyt käsitteet ja määritelmät.

Tietojen keruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastotoimesta annettuun lakiin (409/2001) ja lakiin terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) sekä asetukseen terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (774/1989).

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Raskaudenkeskeytystiedot on kerätty kaikista Suomen raskaudenkeskeyksistä suorittavista sairaaloista. Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista henkilöistä, joille on tehty raskaudenkeskeytys. Toimenpiteitä koskevien lakienv (Laki raskauden keskeyttämisestä 238/1970) sekä niiden nojalla annettujen asetusten (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970) mukaisesti toimenpiteen suorittajalääkärin on toimitettava Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle (Stakes) suoritetusta toimenpiteestä kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta. Tilastot perustuvat THL:n 2.3.2009 mennessä saatuihin ilmoituksiin.

Tiedot tallennetaan lomakkeilta sähköisessä muodossa raskaudenkeskeytsrekistereihin, jota THL ylläpitää terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lain (566/1989) ja sen nojalla annetun asetuksen (774/1989) 6 §:n perusteella. Aineiston tarkistusajoja tehdään säännöllisesti ja epäselvät tapaukset tarkistetaan toimenpiteen suorittaneesta sairaalasta. Tilaston kattavuus on lähes aina 100 %.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein. Epäselvien tapausten selvittämiseksi raskaudenkeskeytsrekisterin tietoja verrataan muiden rekisterien (syntymärekisteri ja hoitoilmoitusrekisteri) tietoihin. Tarvittaessa pyydetään tarkistus toimenpiteen suorittaneesta sairaalasta.

Ennakkotilaston perusteella tehdyn arvion on todettu olevan hyvin lähellä todellista lukumäärää. Yleensä ennakkotilastossa ilmoitetut lukumäärät lisääntyvät hieman lopulliseen tilastoon, koska muutamia lomakkeita palautuu viiveellä sairaaloista. Tilastosta löytyneet mahdolliset virheet korjataan.

Julkaisujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Raskaudenkeskeytystilasto on THL:n kaksi kertaa vuodessa tuottama tilasto. Tilasto ilmestyy maalis- ja syyskuussa. Maaliskuun tilasto on edellisen vuoden ennakkotilasto ja syyskuun tilasto on edellisen vuoden lopullinen tilasto. Lisäksi vuosittain syksyllä ilmestyy puolivuotisennakkotilasto koskien kuluvan vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden raskaudenkeskeytyksiä.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastotiedotteet lähetetään toimenpiteitä suorittaviin sairaaloihin ja julkaistaan THL:n internet sivulla osoitteessa <http://www.thl.fi/tilastot/raskaudenkeskeytykset>.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Ensimmäinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan 1.7.1950. Tilastoja raskaudenkeskeytystä on julkaistu vuodesta 1951 lähtien. Nykyinen raskauden keskeyttämistä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970. Raskaudenkeskeytystiedot ovat vuodesta 1987 alkaen THL:n tietokannassa. Varhaisempien vuosien tiedot on saatu osana virallista tilastoa ilmestyneistä Lääkintöhallituksen julkaisuista (Lääkintöhallitus vuosina 1935–1954; Yleinen terveyden- ja sairaanhoitotilasto vuosina 1955–1970; Terveydenhuolto vuosina 1971–1987).

Vuosien 1987–2004 aineistoa on tarkastettu mm. poistamalla kaksoiskappaleita ja lisäämällä aikaisemmin tilastosta puuttuneita tapauksia. Siksi osa tiedoista poikkeaa aiemmin julkaistuista tilastoista. Ikäryhmiä tarkasteltaessa on huomattava, että rekisterin ikätieto on vuodesta 1994 lähtien potilaan ikä toimenpidepäivänä, sitä ennen ikä vuoden lopussa. Tilastotiedotteisiin on takautuvasti laskettu vuosien 1986–1993 tiedot käyttämällä potilaan ikää toimenpidepäivänä. Tarkemmat tiedot tilastojen tulkinnaan vaikuttavista tekijöistä, mm. lakimuutoksista, on mainittu kunkin taulukon kohdalla erikseen.

Raskaudenkeskeyksen käsitteet ja määritelmät ovat pysyneet koko ajan samoina.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedote sisältää koko maan kattavasti tiedot suoritetuista raskaudenkeskeyksistä. Ennakkotilaston lukumäärität on verrattavissa lopullisen vuositilaston lukumääriin.

Kvalitetsbeskrivning

Statistikuppgifternas relevans

Statistiken över aborter innehåller uppgifter om det årliga antalet aborter. Aborterna presenteras också efter åldersgrupp och sjukvårdsdistrikt per 1000 kvinnor i samma åldrar.

Dessutom presenteras i statistikmeddelandet uppgifter om abortindikationerna, aborttidpunkten enligt graviditetsvecka, tidigare aborter och förlossningar som abortpatienterna genomgått, använda abortmetoder samt preventivmetoder som abortpatienterna använt eller som de enligt planerna kommer att börja använda.

Meddelandet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom specialiteten fortplantningshälsa, förvaltningsmyndigheter, planerare och forskare, som snabbt behöver så aktuella uppgifter om aborter som möjligt.

I statistikmeddelandet förklaras de använda begreppen, definitionerna och symbolerna.

Datainsamlingen bygger på lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) (409/2001) samt på lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och den förordning (774/1989) som utfärdats med stöd av lagen.

Metodbeskrivning för den statistiska forskningen

Uppgifterna om aborter har samlats in från alla finländska sjukhus där aborter utförs. Statistikpopulationen utgörs av personer som genomgått abort. Enligt lagarna om ingrepp (Lag om avbrytande av havandeskap 238/1970) och de förordningar som utfärdats med stöd av dem (Förordning om avbrytande av havandeskap 359/1970) skall den läkare som har utfört ingreppet skicka en anmälan om åtgärden inom en månad på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett till Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Uppgifterna tas från blanketterna och lagras elektroniskt i Abortregistret, som THL upprätthåller i enlighet med lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och 6 § i den förordning (774/1989) som utfärdats med stöd av denna lag. Materialet kontrolleras regelbundet och oklara fall kontrolleras med det sjukhus där ingreppet utförts. Statistikens täckning är nästan alltid 100 procent.

Uppgifternas riktighet och exakthet

Uppgifterna är korrekta om uppgiftslämnarna har lämnat dem rätt. Uppgifterna i Abortregistret jämförs med uppgifterna i andra register (födelseregistret och vårdanmälningsregistret) för att få klarhet i oklara fall. Vid behov begärs en bekräftelse från det sjukhus där ingreppet utförts.

Den uppskattning som gjorts på grundval av den preliminära statistiken har konstaterats ligga mycket nära det faktiska antalet. I allmänhet ökar de antal som angetts i den preliminära statistiken lite i den slutliga statistiken, eftersom några formulär returneras av sjukhusen med visst dröjsmål. Eventuella fel som hittas i statistiken korrigeras.

Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna

THL sammanställer två gånger per år preliminär statistik över aborter och steriliseringar. Statistiken utkommer i april och september. Aprilstatistiken är preliminär statistik över föregående år och

septemberstatistiken är den slutliga statistiken över föregående år. Dessutom utkommer varje höst preliminär halvårsstatistik över aborter under det innevarande årets sex första månader.

Tillgång till uppgifterna och deras transparens/tydlighet

Statistikmeddelandena sänds till de sjukhus som utför ingreppen och offentliggörs på THL webbsidor på adressen <http://www.thl.fi/statistik/aborter>.

Statistikens jämförbarhet

Den första lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft den 1 juli 1950 och statistik över aborter har publicerats sedan 1951. Den gällande lagen om avbrytande av havandeskap är från år 1970. I Stakes databas finns abort- och steriliseringssuppgifter från och med år 1987. Uppgifterna från tidigare år kommer från Medicinalstyrelsens publikationer, som har utgivits som en del av den officiella statistiken (Lääkintöhallitus [Medicinalstyrelsen] 1935–1954), Yleinen terveyden- ja sairaanhoititolasto [Allmän hälso- och sjukvårdsstatistik] 1955–1970), Terveydenhuolto [Hälso- och sjukvård] 1971–1987.

Materialet från 1987–2004 har kontrollerats bl.a. genom att ta bort dubbleller och lägga till fall som saknats i statistiken. Därför kan en del av uppgifterna avvika från statistik som offentliggjorts tidigare. När man granskar åldersgrupper, är det viktigt att beakta att åldersuppgifterna från och med 1994 baserar sig på patientens ålder på ingreppsdagen och före 1994 vid årets slut. I statistikmeddelandena har uppgifterna för åren 1986–1993 beräknats retroaktivt genom att använda patientens ålder på ingreppsdagen. Närmare uppgifter om sådana faktorer som påverkar tolkningen av statistiken, t.ex. lagändringar, anges separat vid varje tabell.

I övrigt har de abortrelaterade begreppen och definitionerna varit de samma hela tiden.

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

Statistikmeddelandet innehåller uppgifter på nationell nivå om utförda aborter. Antalen i den preliminära statistiken är jämförbara med antalen i den slutliga årsstatistiken.

Quality report

The register of induced abortions

Relevance of statistical data

The Register of Induced Abortions contains data on the annual numbers of induced abortions. In addition, data on induced abortions are provided by age group and hospital district per 1000 women of the same age.

The Statistical Summary also gives numbers concerning grounds for induced abortions, the gestational stage at which induced abortions are performed, previous abortions and deliveries among abortion patients, methods of abortion used, and the contraceptive methods that abortion patients have used or that have been planned for them.

The Statistical Summary aims to provide up-to-date information on induced abortions to health-care professionals, administrators, planning officials and researchers working in the area of reproductive health and thus in need of this type of information.

The Summary text describes the concepts, definitions and symbols used in the statistics.

The collection of data is based on the Act on the Statistical Service of the National Research and Development Centre for Welfare and Health (409/2001), as well as on the Act (556/1989) and the Decree (774/1989) on National Personal Records Kept under the Health Care System.

Description of methods used in statistical research

Data on induced abortions are collected from all hospitals in Finland that perform induced abortions. The statistical population consists of all persons who have undergone induced abortion. In accordance with the current legislation (Act (238/1970) and Decree (359/1970)), the physician performing the procedure is required to report the case to the National Institute of Health and Welfare (THL) within one month using a specific data collection form approved by the Ministry of Social Affairs and Health.

The data in the forms are stored electronically in the Register of Induced Abortions, a statutory register maintained by THL pursuant to the Act on National Personal Records Kept under the Health Care System (566/1989), and Section 6 of the subsequent Decree (774/1989). Data check-ups are made regularly and any unclear cases and diagnoses are checked and ascertained by contacting the hospitals that have performed the procedure concerned. The statistics almost invariably have coverage of 100%.

Correctness and accuracy of data

The data are correct if they have been reported correctly. In unclear cases, the data in the Register of Induced Abortions are compared with those in other registers (Birth Register, Care Register). If necessary, the hospital that has performed the procedure is contacted for ascertaining the data.

Estimates made on the basis of the preliminary statistics have found to be very close to the real figures. The numbers of cases given in the preliminary statistics are usually somewhat lower than those in the final statistics as a few notification forms from the hospitals may arrive with a delay. Any errors identified in the statistics will be corrected.

Timeliness and promptness of published data

Statistics on induced abortions are produced by THL biannually, and published in April and September. The April statistics consist of the previous year's preliminary statistics, while the September statistics consist of the previous year's final statistics. In addition, half-year preliminary statistics are published each autumn concerning induced abortions performed during the ongoing year's first six months.

Accessibility and transparency/clarity of data

In addition to being published at the THL website at <http://www.thl.fi/statistics/abortions> and the Statistical Summary is sent to all hospitals that perform abortions.

Comparability of statistical data

In Finland, the Act on Induced Abortion, the first ever piece of legislation on abortion, came into force on 1 July 1950, whilst statistics on induced abortions have been published since 1951. The current Act on Induced Abortions originates from 1970. Since 1987, data on induced abortions and sterilisations have been kept in a THL database. Official statistical publications by the National Board of Health (one of THL's predecessors) have been used as a source of information for earlier years.

Data for 1987–2004 have been checked for instance by removing data that had been entered twice and by adding missing cases, so that these data may deviate from previously published statistics to a degree. With regard to age specific data, it should be noted that from 1994 onwards such data in the Register refer to the age of the patient on the day of the procedure, whereas the data for preceding years refer to the age at the end of the year. For the purposes of the Statistical Summary, the data for 1986–1993 have been calculated retrospectively using the patient's age on the day of the procedure. More accurate information on any factors influencing the interpretation of the statistics, such as legislative reforms, is given specifically for each table.

The concept of induced abortion, as well as their definitions, have remained unchanged all the time.

Clarity and consistency

The data on induced abortions in the Statistical Summary are nationwide. The numbers of cases given in the preliminary statistics are comparable with those in the final annual statistics.